

HINTS + Undersøkelse av akutt svimmelhet, AVS.
 Akutt innsettende og kontinuerlig vertigo med kvalme/oppkast, ustøhet og nystagmus.

	Undersøkelse	Vestibularisnevritt	Hjerneslag
HI	Hodeimpulsetest Sitt foran P med Ps hode i et fast grep. Be pas om å se på ditt ene øye. Gjør en kort (30 gr), rask bevegelse med Ps hode til siden og observer om P holder blikket festet på ditt øye.	Positiv: Ps øyne beveger seg med hodebevegelsen mot sykt øre, etterfulgt av en korrigerende saccade tilbake til ditt ene øye.	Negativ: P holder øyne holdes fiksert på ditt ene øye ved raske hodebevegelser mot begge sider.
NT	Nystagmus Observer for nystagmus når Ps hode er i ro og retter blikket framover deretter litt til siden (20gr) uten å feste blikket. Bruk gjerne frenzels brille.	Primær horisontal- rotatorisk. Øker ved blikk i retning av rask fase Ikke retningsskiftende Dempes ved blikkfiksasjon	Primær vertikal, eller rotatorisk. Endrer retning ved sideblikk Dempes i liten grad ved blikkfiksasjon
S	Vertikal skjeling Dekk til Ps ene øye med din hånd i 5 sek. mens P ser på ditt ene øye. Flytt deretter hånden over til det andre øyet og se om det avdekkede øyet justerer seg i vertikalplanet.	Negativ: Ingen vertikal justering	Positiv: Vertikal justering
+	Nyoppstått hørselstap (fingergnissing/weber) el. neurologiske utfall	nei	ja
+	Kan sitte/stå uten støtte	ja	nei

